

**ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ СИСТЕМЫ
ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ**

**Шайхутдинова Р.В.,
Сибирский федеральный университет**

Таблица 1 – Частота встречаемости генетических полиморфизмов в генах системы гемостаза в общей группе жителей Красноярского края

| Ген | Генотип | Частота (абс.) | Частота (%) |
|-------------------------|---------|----------------|-------------|
| FII G20210A (N=624) | G/G | | |
| | G/A | | |
| FV G1691A (N=622) | G/G | | |
| | G/A | | |
| FVII G10976A (N=603) | G/G | | |
| | G/A | | |
| | A/A | | |
| MTHFR C677T (N=616) | C/C | | |
| | C/T | | |
| | T/T | | |
| PAI-1-675 5G/4G (N=580) | 5G/5G | | |
| | 5G/4G | | |
| | 4G/4G | | |
| ITGB3 T1565C (N=207) | T/T | | |
| | T/C | | |
| | C/C | | |
| PROC A2583T (N=225) | A/A | | |
| | A/T | | |
| | T/T | | |
| SERPINC1G786A (N=226) | G/G | | |
| | G/A | | |
| | A/A | | |